

Kosteuden seuranta maassa uudella tekniikalla

Eemeli Linna

MTT, Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema, *Tutkimusasemantie 15, 92400 Ruukki*, eemeli.linna@mtt.fi

Johdanto

Jotta kasvien kasvu ja ravinteiden hyväksikäyttö turvataan, maassa on oltava riittävästi kosteutta. Maan kosteutta seurataan kosteudenseurantalaitteistolla ja sillä määritetään ensisijaisesti kastelutarve. Lisäksi kosteudenseurantalaitteistolla tarkastellaan maan hydraulista johtokykyä ja kasvien vedenottoa. Kosteudenseurantalaitteisto auttaa ymmärtämään maan kosteusolosuhteita ja veden liikkeitä.

Esitelmässä käytetty maan kosteuden mittaustieto on MMM:n rahoituksella vuonna 2000 toteutetusta Perunan tihkukastelu – kalsiumlannoitustutkimuksesta. Maan kosteuden seurattiin Diviner 2000 ja Enviroscan –järjestelmillä, ja tutkimuksessa verrattiin tihkukasteltua ja kastelematonta koe-lohkoa toisiinsa.

Aineisto ja menetelmät

Tihkukastelu – lannoituskoe toteutettiin kenttäkokeena Pyhäjoella. Kosteuden seuranta varten koe-lohkolle kairattiin reikiä mittaustieteilijöille ja jokaiseen reikään upotettiin muoviputki. Laitteet mit-taavat maan kapasitiivisia ominaisuuksia noin 100 Mhz:n taajuudella muoviputken seinämän läpi. Saadut raakalukemat muutetaan regressiomallin avulla kosteuspitoisuuksiksi. Valmistaja on omien tietojensa mukaan tehnyt mallin osittain laboratorio-olosuhteissa ja osittain kenttäkokeilla. Mittaustu-loksena saadaan kosteus tilavuuspitoisuusprosentteina maasta. Laitteiden absoluuttista tarkkuutta ei testattu.

Kokeen maalaji oli karkea hietta. Sen lakastumisraja on noin 7 % vettä maatilavuudesta (Rowell 1996). Pääsääntöisesti kastelu aloitettiin kosteuspitoisuuden ollessa 12 % maatilavuudesta. Teori-assa kastelu aloitetaan, kun kosteus on 65 % kenttäkapasiteetista, eli kosteuspitoisuuksina 12 – 14 % maatilavuudesta. (Potato Association of America Handbook 2001). Kasveille käyttökelpoisen veden sitomiskyky on karkealla hiedalla noin 12 – 14 % (Rowell 1996).

Kenttäkokeen pääruudut olivat tihkukastelu ja kastelematon. Lannoitusmenetelmät olivat osa-ruutuina. Koelohko oli osana isompaa noin 2,5 hehtaarin tihkukastelussa olevaa lohkoa. Tässä yhtey-dessä tarkastellaan ainoastaan kosteuden seurantaan ja vesitalouteen liittyviä tuloksia. Tulokset eivät ole ilman lisätutkimuksia sovellettavissa muille maalajeille.

Tulokset ja tulosten tarkastelu

Kosteuden muutokset kastellulla ja kastelemattomalla lohkolle kasvukauden aikana

Kastelemattoman lohkon kosteuspitoisuus laski 10 – 40 cm:n kerroksissa elokuun puoleen väliin saak-ka (kuva 1), mihin saakka myös luontainen sadanta oli vähäistä. Sen jälkeen sadeiden vaikutuksesta maan kosteuspitoisuus pysyi korkealla kasvukauden loppuun.


Kastelematon lohko kärsi jonkinasteisesta kuivuusstressistä elokuun alkupuolella (kuva 1). Pe-runalla maan kosteuspitoisuus ei saisi laskea alle 65 % kenttäkapasiteetista (Potato Association of America Handbook 2001). Kosteuspitoisuus laski 65 %:n alapuolelle lähtökosteudesta, joka oli jo mittausten alkaessa kenttäkapasiteetin alapuolella. Kasvukauden lopulla kosteuspitoisuudet olivat huomattavasti alkukesän lukemia korkeammat.

Kastellulla lohkolle kosteuspitoisuudet olivat suhteellisen korkeat koko kasvukauden ajan (kuva 2). Mittausanturi sijaitti keskellä penkkiä ja tihkuletku oli antureiden vieressä. Kasteluvesi valui tihkuletkusta antureiden mittausalueelle, mikä nosti kosteuskokemia kastelun vaikutuksesta hetkelli-sesti korkealle. Kosteuspitoisuus pysyi kastelun vaikutuksesta huomattavasti korkeammalla lähtö- ja loppukosteuteen sekä kastelemattomaan lohkokseen verrattuna.


Käsinmittauksessa putken 12 kosteuskokemia olivat mittausten alkaessa muita mittauspisteitä huomattavasti matalampia (kuva 3). Lukemat kuitenkin nousivat kasvukauden aikana kaventaen eroa muihin mittauspisteisiin. On mahdollista, että mittausputken ja maan välissä oli ilmatilaa, joka hitaasti täyttyi kasvukauden edetessä. Poikkeavasta lähtökosteudesta huolimatta kosteuden muutokset olivat kasvukauden aikana loogisia.

Maan hydraulinen johtavuus, veden liike ja kasvien vedenoton tarkastelu

Kastelun vaikutuksesta pintakerrosten kosteuspitoisuus oli korkeampi ja lisäveden sitomiskyky heikompi kuin kastelemattomalla lohkolla (kuva 4). Elokuun 15. päivä satoi 32 mm. Sateen vaikutuksesta kosteuskokemat nousivat kastellulla lohkolla järjestelmällisesti kaikilla syvyyksillä (kuva 2). Pintakerrokset pidättivät osan sadevedestä, mikä hiukan vaimensi sateen vaikutusta syvemmissä maakerroksissa.




Kuva 1. Kastelemattoman lohkon kosteuskokemat ajan suhteen. Käyrät on sijoitettu kuvaajaan mittaussyvyyden mukaiseen järjestykseen. Jokainen käyrä vastaa yhtä mittaussyvyyttä. Järjestys ylhäältä alaspäin: 10, 20, 30 ja 40 cm. Jokaista mittaussyvyyttä vastaavat kosteuspitoisuudet on ilmoitettu millimetreinä kuvaajan molemmin puolin.



Kuva 2. Tihkukastellun lohkon kosteuskokemat ajan suhteen. Käyrät on sijoitettu kuvaajaan mittaussyvyyden mukaiseen järjestykseen. Jokainen käyrä vastaa yhtä mittaussyvyyttä. Järjestys ylhäältä alaspäin: 10, 20, 30 ja 40 cm. Jokaista mittaussyvyyttä vastaavat kosteuspitoisuudet on ilmoitettu millimetreinä kuvaajan molemmin puolin.

Kastelemattomalla lohkolla maan pintakerrokset pidättivät sadevettä huomattavasti suuremman määrän kasteltuun verrattuna (kuva 1). Syvemmissä maakerroksissa kosteuskokemat nousivat kasteltua myöhemmin ja muutokset olivat pienempiä. Lisäksi kastelemattomalla lohkolla osa sadevedestä virtasi

penkin pintaa pitkin, mikä näkyy elokuun 16. päivä äkillisenä kosteuden nousuna 30 cm:n syvyydessä. Sama ilmiö esiintyi erään heinäkuun ukkoskuuron jälkeen, jolloin vettä satoi 5 – 8 mm lyhyessä ajassa. Vesi jakautui kasteltuun maahan tasaisesti eri syvyyksille, mutta kuivassa penkissä kosteuden selvä nousu havaittiin vain 30 cm:n syvyydessä. Vesi virtasi kuivan penkin pintaa pitkin vakoon ja imeytyi sieltä maahan myöhemmin (kuva 4). Kastellun maan hydraulinen johtavuus on huomattavasti kastelematonta parempi (Rowell 1996).



Kuva 3. Käsin mitattujen kosteuskäyrien keskiarvokäyrät neljästä mittauspisteestä ajan suhteen. 12 ja 14 ovat tihkukastellulta lohkolta ja 13 ja 15 ovat kastelemattomalta lohkolta. Kaikki käyrien pisteet ovat neljän mittaussyvyyden keskiarvoja. Mittaussyvyydet ovat 10, 20, 30 ja 40 cm.

Käsinmittauksen mukaan elokuun puolivälissä sateiden vaikutus nähdään 50 – 70 cm:n kerroksissa selvemmin kastellulla kuin kastelemattomalla lohkolta. Kastellun maan pintakerrosten lisäveden sitomiskyky oli kastelematonta heikompi ja siitä syystä 50 – 70 cm:n kerrokseen valunut vesimäärä oli suurempi. Tämä tukee jatkuvan seurannan tuloksia.


Sateen ja kastelun lisäksi kosteuspitoisuuksia muuttavia tekijöitä maassa ovat gravitaation aiheuttama valunta, kosteuserojen tasoittuminen, evaporaatio ja kasvien vedenotto. Kosteuserojen tasoittuminen sisältää kapillaarisen vedennousun. Evaporaatio on suurimmillaan pinnassa ja juurten vedenotto 20 – 40 cm syvyydellä. Kokeessa kasvien vedenotto oli voimakkainta 30 cm:n syvyydessä kastelusta riippumatta (kuvat 1 ja 2).

Kosteuskäyrät laskevat päiväsaikaan jyrkästi kasvien vedenoton ja evaporaation vaikutuksesta kastelusta riippumatta (kuvat 1 ja 2). Öisin mittaustulokset laskevat kastellulla ja nousevat kastelemattomalla lohkolta. Kosteuskäyrät muuttuvat öisin pääasiassa vain kosteuserojen tasoittumisen vaikutuksesta. Kastellulla lohkolta vesi liikkuu pois päin penkin keskiosasta ja kastelemattomalla penkin keskiosaan päin (kuva 4). Evaporaation osuutta on mahdoton päätellä kosteudenseurannan perusteella.

Kasvien vedenottoa voidaan karkeasti vertailla jatkuvan seurannan mittaustulosten perusteella, jos valitaan ajanjakso, jolloin ei sada eikä ole kastelua. Laskentatapa olettaa, että maassa tapahtuva veden liike on vakio ympäri vuorokauden ja lisäksi kasvien vedenottoa ja evaporaatiota tapahtuu vain päivisin. Kasvien vedenotto ja evaporaatio lasketaan erilleen vähentämällä öisestä kosteuden muutosnopeudesta päivittäinen kosteuden muutosnopeus (mm/h). Evaporaation osuus on kasvien vedenottoon verrattuna pieni, koska vertailussa on mukana mittaussyvyydet 40 cm:iin saakka.

Näin laskettuna kasvien vedenotto ja evaporaatio oli voimakkaampaa kastellulla kuin kastelemattomalla lohkolta heinäkuun lopussa ja elokuun alkupuolella. Elokuun viimeisinä päivinä kastelemattoman lohkon vedenotto oli kuitenkin huomattavasti kasteltua voimakkaampaa. Elokuun kuivuus hidasti mahdollisesti ravinteiden hyväksikäyttöä, mikä näkyi myöhäisenä vedenottona kastelematto-

malla lohkolla. Satotulokset tukevat tätä perustelua (Forsman & Virtanen 2000). Menetelmässä kuitenkin tehdään karkeita yleistyksiä. Menetelmä pitäisi todentaa useilla mittauspisteellä, jatkuvilla kasvustohavainnoilla ja sääasemalla, joka mittaa haihdunnan lohkoittain.



Kuva 4. Kosteuserojen aiheuttama veden liike ja sadeveden imeytyminen karkealla hiedalla kastellulla ja kuivuudesta kärsivällä lohkolla. Tihkukastellussa penkissä on kasteluletku penkin yläosassa ja kasteluvesi on merkitty pienillä vaaleansinisillä nuolilla. Perunat on merkitty keltaisella. Kuvassa ei ole juuristoa.

Johtopäätökset

Kastelematon lohko kärsi todennäköisesti kasvukauden aikana jonkinasteisesta vedenpuutteesta elokuun alkupuolella. Tätä puoltaa maan runsas kuivuminen, heikompi vedenotto ja pienempi kasvunoton ja lopullisen noston sato (Forsman & Virtanen 2000). Vedenotto oli voimakkainta 30 cm:n syvyydellä. Tihkukastelu näytti pitävän kosteutta yllä enimmäkseen juuristovyöhykkeessä. Kastelun vaikutuksesta syvälle huuhtoutuneet vesimäärät olivat vähäisiä. Sateet todistivat koelohkon maalajilla sen, että penkin perusteellisen kuivumisen jälkeen hydraulinen johtokyky on heikko. Päältäkastelua käytettäessä vesi on annosteltava pienissä erissä, jotta se imeytyisi tehokkaasti penkkiin.

Laitteiden absoluuttisesta tarkkuudesta ei ole riittävästi tietoa. Kosteudenseurannan tuloksia voidaan kuitenkin tulkita tällä tarkkuudella sekä kasvukauden aikana tapahtuvien kosteuden muutosten perusteella riittävästi, jotta kastelutarve voidaan määrittää. Kosteudenseurantamenetelmillä voidaan välttää liikakastelu ja mahdolliset ravinnehuuhtoumat.

Kirjallisuus

- Forsman, K., Virtanen, E. 2000. Perunan tihkukastelu –hanke. Tutkimusraportti 2000. Biologiaosio. Maa- ja metsätalousministeriö. Perunan tihkukasteluhanke. 55 s.
- Linna, E. 2000. Perunan tihkukastelu –hanke. Tutkimusraportti 2000. Vesitalous- ja teknologiaosio. Maa- ja metsätalousministeriö. Perunan tihkukasteluhanke. 55 s.
- Linna, E. 2001. Tihkukastelu perunalle. Laitteiston toiminta, käyttö ja vesitalous. Kandidaatintutkielma. 37 s.
- Potato Association of America Handbook. 2001. Saatavilla www.muodossa: URL: <http://www.css.orst.edu/Classes/CSS322/Growing.htm>. 27.4.2001.
- Rowell, D. L. 1994. Soil science: Methods and applications. Department of Soil Science, University of Reading. Reprinted 1995, 1996. Addison Wesley Longman Limited. 350 p.